



baqsimi™

3mg polvere nasale (glucagone)



SII PRONTO A GESTIRE UNA EMERGENZA PER BASSI LIVELLI DI GLUCOSIO NEL SANGUE

Se assumi insulina, è necessario che tu sia preparato a gestire un'emergenza caratterizzata da glicemia bassa nel sangue (ipoglicemia severa).

Leggi per saperne di più su BAQSIMI e le emergenze per bassi livelli di zucchero nel sangue.

INDICAZIONE

BAQSIMI è indicato per il trattamento della ipoglicemia severa negli adulti, negli adolescenti e nei bambini di età uguale o superiore a 4 anni con diabete mellito.

COSA È BAQSIMI

- BAQSIMI è una forma di glucagone che viene somministrato sotto forma di spruzzo nel naso. Il glucagone è un ormone naturalmente prodotto dal pancreas. Agisce in modo opposto all'insulina e aumenta lo zucchero nel sangue.
- BAQSIMI è pronto all'uso e non deve essere miscelato o misurato. È fornito in una dose precisa e pre-dosata.
- BAQSIMI non deve essere inalato. **Dovrebbe essere somministrato in caso di una emergenza per bassi livelli di zucchero nel sangue, anche se incosciente, se il tuo naso è congestionato o se hai utilizzato dei decongestionanti.**
- BAQSIMI non deve essere conservato in frigo.



QUANDO UTILIZZARE BAQSIMI

- BAQSIMI è utilizzato quando una persona ha una emergenza per basso livello di glucosio nel sangue, quando non è in grado di bere o mangiare ed ha bisogno dell'aiuto di una terza persona.
- È importante che le persone intorno a te riconoscano i segnali di un'emergenza da basso livello di zucchero nel sangue, e che siano preparate per aiutarti

I possibili segnali di una emergenza per basso livello di zucchero nel sangue sono:

- Capogiri
- Sbalzi d'umore
- Disattenzione o confusione
- Mancanza di coordinazione
- Convulsione o perdita di conoscenza
- Agitazione o sudorazione



Non rimuovere la pellicola di plastica finché non si è pronti all'uso del medicinale



baqsimiTM

3mg polvere nasale (glucagone)

COME UTILIZZARE BAQSIMI

Prima di utilizzare BAQSIMI leggere le istruzioni d'uso

- Mostra ai tuoi amici e familiari dove conservi BAQSIMI e spiega loro come utilizzarlo. **Loro devono sapere come utilizzarlo prima che tu ne abbia bisogno.**
- Tenere il contenitore monodose nel contenitore cilindrico chiuso con la pellicola di plastica finché non si è pronti all'utilizzo. Se il contenitore cilindrico è stato aperto, il contenuto monodose potrebbe essere stato esposto all'umidità. Ciò potrebbe far sì che il medicinale non funzioni come previsto.
- **Non** premere il pistone prima di avere inserito il dispositivo nel naso altrimenti la dose andrà persa.
- Non usare BAQSIMI dopo la data di scadenza.

Come prepararsi alla somministrazione:

- Rimuovere la pellicola di plastica tirando la striscia rossa.
- Aprire il coperchio ed estrarre il contenitore monodose dal contenitore cilindrico.




Non rimuovere la pellicola di plastica finché non si è pronti all'uso del medicinale

SOMMINISTRAZIONE DI BAQSIMI

Somministrazione della dose:



- **TENERE** il contenitore monodose tra le dita e il pollice, come mostrato. **Non provarlo prima dell'uso in quanto contiene una singola dose di glucagone e non può essere riutilizzato.**



- **INSERIRE** delicatamente l'estremità del dispositivo in una delle narici fino a quando il dito non tocca la parte esterna del naso.



- **PREMERE** il pistone fino in fondo con il pollice. **La somministrazione della dose è completa quando la linea verde sul pistone non è più visibile.**



baqsimi™

3mg polvere nasale (glucagone)

SOMMINISTRAZIONE DI BAQSIMI

Dopo la somministrazione della dose:

Se il paziente con i bassi livelli di zucchero nel sangue non è cosciente, lo posizioni su un fianco dopo la somministrazione di BAQSIMI .

Chiami immediatamente l'assistenza medica.

Incoraggiare il paziente con i bassi livelli di zucchero nel sangue a mangiare il prima possibile. Uno snack ad alto contenuto di zucchero eviterà un altro calo del livello di zucchero nel sangue.

Gettare via l'erogatore e il tubo utilizzati.

Non rimuovere la pellicola di plastica finché non si è pronti all'uso del medicinale



Per guardare un video su
come utilizzare BAQSIMI, visiti il sito
www.baqsimi.eu

AIUTA GLI ALTRI A SAPERE CHE HAI BAQSIMI CON TE

La card e la card per portachiavi di BAQSIMI sono pensate per dire alle persone intorno cosa cercare per trattare un'emergenza per basso livello di zucchero nel sangue.

Seleziona quale delle due opzioni fa più al caso tuo e tienila in un punto dove altre persone possono trovarla facilmente.

**IN CASO DI UNA
EMERGENZA PER BASSO
LIVELLO DI ZUCCHERO
NEL SANGUE, CERCA UN
CONTENITORE GIALLO**

**HO IL DIABETE.
IN CASO DI
EMERGENZA PER
BASSO LIVELLO
DI ZUCCHERO
NEL SANGUE, IO NON
SONO IN GRADO
DI INTERVENIRE
DA SOLO.**

Cerca un piccolo tubo giallo nel/sul

**Non rimuovere la pellicola
di plastica finché non si è pronti
all'uso del medicinale.
Segui le istruzioni d'uso e poi chiama
immediatamente l'assistenza medica.**



baqsimi™

3mg polvere nasale (glucagone)



baqsimi™

3mg polvere nasale (glucagone)



Non rimuovere la
pellicola di plastica
finché non si è pronti
all'uso del medicinale

AVAS+

Concessionario di vendita:
Avas Pharmaceuticals S.r.l.,
Ripa di Porta Ticinese, 39
20143 Milano (MI)
e-mail: medinfo@avaspharma.com
Tel: 02 4792 3811

 **AMPHASTAR**
PHARMACEUTICALS

Amphastar France Pharmaceuticals
Usine Saint Charles 60590 Eragny sur Epte,
Francia

© 2024 Amphastar
01-512-01-IT

Approvato da AIFA il 22/05/2024

**IN CASO DI UNA
EMERGENZA PER BASSO
LIVELLO DI ZUCCHERO
NEL SANGUE, CERCA UN
CONTENITORE GIALLO**

**HO IL DIABETE.
IN CASO DI
EMERGENZA PER
BASSO LIVELLO
DI ZUCCHERO
NEL SANGUE, IO NON
SONO IN GRADO
DI INTERVENIRE
DA SOLO.**

Cerca un piccolo tubo giallo nel/sul



**Non rimuovere la pellicola
di plastica finché non si è pronti
all'uso del medicinale.**

**Segui le istruzioni d'uso e poi chiama
immediatamente l'assistenza medica.**

**CHIAMA PER
ASSISTENZA MEDICA**

**HO IL DIABETE.
IN CASO DI
EMERGENZA PER
BASSO LIVELLO
DI ZUCCHERO
NEL SANGUE, IO NON
SONO IN GRADO
DI INTERVENIRE
DA SOLO.**

Cerca un piccolo tubo giallo nel/sul



**Non rimuovere la pellicola
di plastica finché non si è pronti
all'uso del medicinale.
Segui le istruzioni d'uso e poi chiama
immediatamente l'assistenza medica.**