

# baqsimi<sup>®</sup>

3mg pó nasal (glucagom)



## FOLHETO DE ADMINISTRAÇÃO DO DOENTE

V2.0/Setembro 2024

### INDICAÇÃO

Baqsimi<sup>®</sup> contém a substância ativa glucagom, é utilizado para tratar a hipoglicemia grave (nível muito baixo de açúcar no sangue) em adultos, adolescentes e crianças com idade igual ou superior a 4 anos com diabetes *mellitus*.

# O QUE É BAQSIMI®

- Baqsimi® contém glucagom em pó, de administração nasal com uma pulverização apenas numa das narinas. O glucagom é uma hormona natural produzida pelo pâncreas, que atua de forma contrária à insulina, ou seja, aumenta o nível de açúcar no sangue
- Baqsimi® está pronto a ser utilizado e é fornecido numa dose precisa
- **Deve ser administrado numa emergência provocada por níveis baixos de açúcar no sangue mesmo que esteja inconsciente, o seu nariz esteja congestionado ou tenha tomado descongestionantes**



Manter o tubo selado.  
Não abrir até ao momento de utilizar.

# COMO UTILIZAR BAQSIMI®

## Leia as Instruções de utilização incluídas no interior da embalagem do medicamento antes de o utilizar

- Mostre aos seus familiares e amigos onde guarda Baqsimi® e explique como utilizá-lo. **Eles precisam de saber como o utilizar antes de necessitar dele**
- **Não** retire a película nem abra o tubo até ao momento de o utilizar
- **Se** o tubo tiver sido aberto, o medicamento pode ter sido exposto a humidade.
- **Não** pressione o êmbolo até estar pronto para administrar a dose. Caso contrário, irá desperdiçar a única dose do dispensador

### Preparar a dose:

- Retire a película puxando a fita vermelha
- Abra a tampa e retire o recipiente unidose do tubo



# ADMINISTRAÇÃO DE BAQSIMI®

Administrar a dose:



- **SEGURE** o recipiente unido-se como indicado na figura. **Não pressione o êmbolo antes de inserir o recipiente no nariz**



- **INSIRA** a ponta numa das narinas



- **EMPURRE** completamente o êmbolo **até deixar de ver o traço verde**




## Depois de administrar a dose:

Se a pessoa estiver inconsciente, vire-a de lado depois de administrar BAQSIMI.

## Peça imediatamente ajuda médica.

Quando a pessoa responder ao tratamento, tente fazer com que coma ou beba um alimento com um elevado teor de açúcar, como um pacote de açúcar ou um sumo de fruta, o mais depressa possível.

## Deite fora o recipiente unidose e o tubo depois de utilizados.



## INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA IMPORTANTE

Se tiver quaisquer efeitos indesejáveis, fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro. Também poderá comunicar efeitos indesejáveis diretamente através do endereço <http://www.infarmed.pt/web/infarmed/> submissoram (preferencialmente) ou através dos seguintes contactos: Direção de Gestão do Risco de Medicamentos - Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53. 1749-004 Lisboa. Tel: +351 21 798 73 73; Linha do Medicamento: 800222444 (gratuita) ou e-mail: [farmacovigilancia@infarmed.pt](mailto:farmacovigilancia@infarmed.pt).

Também poderá comunicar efeitos indesejáveis diretamente à Amphastar France Pharmaceuticals através do contato +351 304 500 769 ou e-mail: [gps@amphastar.com](mailto:gps@amphastar.com)

Ao comunicar efeitos indesejáveis, estará a ajudar a fornecer mais informações sobre a segurança deste medicamento.



[www.baqsimi.eu](http://www.baqsimi.eu)

**Amphastar France Pharmaceuticals**

Usine Saint Charles 60590 Eragny sur Epte  
França

MAH VAT - FR86 801 531 427.

© 2024 Amphastar

01-512-01-PT

V2.0/Setembro 2024



**AMPHASTAR**  
PHARMACEUTICALS