

Guía para pacientes sobre la administración de Baqsimi®

Baqsimi® glucagón 3 mg polvo nasal



Consulte esta Guía junto con el prospecto del medicamento disponible en www.cima.aemps.es

Información sobre prevención de riesgos acordada con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Abril 2024

Disponible en la web de la AEMPS

www.aemps.gob.es

QUÉ ES BAQSIMI®

Baqsimi® es un medicamento, cuyo dispositivo:

- Permite la administración por vía nasal de glucagón (una hormona natural producida por el páncreas).
- Está listo para su uso y no necesita mezclarse o medirse. Su dosis es precisa y se ha medido previamente.
- **Se utiliza para tratar episodios de hipoglucemia grave (azúcar muy bajo en sangre) en pacientes diabéticos, ya que el glucagón aumenta los niveles de azúcar en sangre.**
- Contiene la cantidad exacta de glucagón para realizar una administración, por lo que **cada dispositivo solamente puede utilizarse una vez.**
- Debe conservarse por debajo de los 30 grados centígrados. No es necesario guardarlo en la nevera.



Mantenga el tubo precintado hasta el momento de su uso.

CUÁNDO USAR BAQSIMI®

- Los pacientes diabéticos en tratamiento con insulina saben que en algún momento de sus vidas pueden llegar a sufrir un episodio de hipoglucemia.
- Baqsimi® se utiliza cuando una persona se encuentra en una situación de emergencia por una hipoglucemia grave, en la que necesita la ayuda de otra persona para superarla. En estas circunstancias se administrará Baqsimi® aun cuando el paciente tenga la nariz congestionada o haya utilizado previamente descongestionantes e incluso aunque se encuentre inconsciente (ya que Baqsimi® no necesita ser inhalado).
- Es importante que las personas que conviven con el paciente, así como su entorno más cercano, sepan reconocer los posibles signos y síntomas de una hipoglucemia grave para que puedan estar preparados y ayudarlo en caso necesario. Entre dichos signos y síntomas se incluyen:
 - Mareo
 - Falta de atención o confusión
 - Convulsiones o pérdida del conocimiento
 - Cambios de humor
 - Falta de coordinación
 - Temblores o sudoración



Lea atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar Baqsimi®

- Además, enseñe a sus familiares y amigos dónde guarda Baqsimi® y explíqueles cómo se usa. Es necesario que sepan con antelación cómo utilizar el dispositivo para que, en caso de que tengan que hacerlo, conozcan perfectamente el funcionamiento del mismo.
- **No** retire el precinto ni abra el tubo hasta que sea necesario usar el dispositivo. Si se abre el tubo, es posible que se introduzca humedad en el dispositivo y esto podría causar que el medicamento no funcione como se esperaba.
- **No** presione el émbolo del dispositivo hasta que vaya a administrarse el glucagón. Recuerde que si lo hace, se perderá la única dosis contenida en el dispositivo.
- Baqsimi® no se debe usar después de la fecha de caducidad que aparece en el envase.



Mantenga el tubo precintado hasta el momento de su uso.

ADMINISTRACIÓN DE BAQSIMI®

Justo antes de la administración:

- Retire el precinto tirando de la banda roja
- Abra la tapa y saque el dispositivo del tubo

Cómo se administra la dosis:



- **SUJETE** el dispositivo tal y como se muestra en la imagen. **No presione el émbolo antes de introducirlo en la fosa nasal.**



- **INTRODUZCA** la punta del dispositivo en una de las fosas nasales.



- **PRESIONE** el émbolo hasta el final **hasta que la línea verde ya no sea visible.**
- **Deseche el dispositivo una vez utilizado.**

- Si la persona está inconsciente, póngala de lado una vez que le haya administrado Baqsimi® y solicite asistencia médica inmediata.
- Si la persona está consciente, anímela a comer o beber lo antes posible un alimento o bebida con alto contenido en azúcar como por ejemplo un dulce o un zumo de fruta.

Su médico le enseñará a utilizar Baqsimi® utilizando un dispositivo de prueba (vacío, sin glucagón) para que se familiarice con su utilización.

INFORMACIÓN DESTINADA AL ENTORNO DE LOS PACIENTES:

- Es importante que usted también sepa cómo administrar Baqsimi®, ya que si un paciente sufre una crisis hipoglucémica, es posible que pierda el conocimiento y necesite ayuda.



Mantenga el tubo precintado hasta el momento de su uso.

Puede encontrar toda la información correspondiente al correcto manejo y administración de Baqsimi® en un vídeo en el siguiente enlace:

baqsimi.eu

INFORME A OTROS DE QUE LLEVA BAQSIMI® CON USTED

Esta Guía incluye una tarjeta de Baqsimi® para que lleve constantemente con usted. De esta manera, la gente que le rodea sabrá qué hacer para ayudarlo en una situación de emergencia en la que presente una hipoglucemia grave y usted haya perdido el conocimiento o esté muy débil como para administrarse Baqsimi® por sí mismo/a sin ayuda.

Asegúrese de escribir en el espacio en blanco dónde guarda Baqsimi®. Le recomendamos que lo lleve en la cartera o si no, en un lugar fácilmente alcanzable, como un bolsillo de su bolso.

SOY DIABÉTICO/A.

EN UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA POR UN NIVEL BAJO DE AZÚCAR EN SANGRE NO ME PUEDO TRATAR A MÍ MISMO/A.

Busque un pequeño tubo amarillo, que contiene un medicamento que se llama Baqsimi® y que guardo en

Mantenga el tubo precintado hasta el momento de su uso.

Introduzca la punta del dispositivo en una de mis fosas nasales y pulse el émbolo. Pida asistencia médica inmediatamente.

**Baqsimi®
glucagón 3 mg polvo nasal**

Baqsimi® glucagón 3 mg polvo nasal

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en el prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano:

<https://www.notificaRAM.es>

Mantenga el tubo precintado hasta el momento de su uso.



SOY DIABÉTICO/A.

EN UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA POR UN NIVEL BAJO DE AZÚCAR EN SANGRE NO ME PUEDO TRATAR A MÍ MISMO/A.

Busque un pequeño tubo amarillo, que contiene un medicamento que se llama Baqsimi® y que guardo en



Mantenga el tubo precintado hasta el momento de su uso. Introduzca la punta del dispositivo en una de mis fosas nasales y pulse el émbolo. Pida asistencia médica inmediatamente.

SOY DIABÉTICO/A.

EN UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA POR UN NIVEL BAJO DE AZÚCAR EN SANGRE NO ME PUEDO TRATAR A MÍ MISMO/A.

Busque un pequeño tubo amarillo, que contiene un medicamento que se llama Baqsimi® y que guardo en



Mantenga el tubo precintado hasta el momento de su uso. Introduzca la punta del dispositivo en una de mis fosas nasales y pulse el émbolo. Pida asistencia médica inmediatamente.