



# baqsimi<sup>®</sup>

(Glucagon) 3 mg neuspoeder  
in een container met een enkele dosis



Houd de koker verzegeld  
tot op het moment van  
gebruik.

Baqsimi<sup>®</sup> is een merk dat eigendom is van  
of geautoriseerd is door Amphastar zijn  
dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen.

V.U. : Amphastar France Pharmaceuticals  
Usine Saint Charles 60590 Eragny sur Epte,  
Frankrijk  
01-512-01-BE – Juni 2024



Om een maximaal voordeel te halen voor uw gezondheid uit de effecten van het geneesmiddel Baqsimi®, om voor een goed gebruik ervan te zorgen en om de ongewenste effecten ervan te beperken, zijn er bepaalde maatregelen/voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen, die in dit materiaal worden uitgelegd. (RMA-versie 06/2024)



**baqsimi**®

(Glucagon) 3 mg neuspoeder  
in een container met een enkele dosis



## TOEDIENINGSINSTRUCTIES VOOR DE PATIËNT

Lees aandachtig de bijsluiter alvorens u het geneesmiddel Baqsimi® (Glucagon) 3 mg neuspoeder in een container met een enkele dosis gebruikt. De volledige en geactualiseerde tekst van deze bijsluiter is beschikbaar op de website [www.fagg.be](http://www.fagg.be), rubriek “Zoek informatie over een vergund geneesmiddel”.

# WAT IS BAQSIMI®?

- **INDICATIE**

Baqsimi® is geïndiceerd voor de behandeling van ernstige hypoglykemie bij volwassenen, jongeren en kinderen ouder dan 4 jaar met diabetes.

- Baqsimi® is een vorm van glucagon die met een neus-spray wordt toegediend. Glucagon is een natuurlijk hormoon dat door de alvleesklier wordt geproduceerd. Het werkt op een tegenovergestelde manier als insuline en verhoogt de bloedsuikerspiegel.
- Baqsimi® is klaar voor gebruik. Het bevat een nauwkeurige en vaste dosis. Het is niet nodig het geneesmiddel te reconstitueren noch aan te passen.
- Baqsimi® moet niet geïnhaleerd worden. **Het dient toegediend te worden in geval van nood als gevolg van een ernstige hypoglykemie (zeer lage bloedsuikerspiegel), zelfs wanneer u bewusteloos bent, of een verstopte neus heeft of u gelijktijdig gebruik maakt van een decongestivum.**
- Het is niet nodig Baqsimi® in de koelkast te bewaren. Niet boven 30°C bewaren.



# WANNEER BAQSIMI® GEBRUIKEN?

- Baqsimi® wordt gebruikt wanneer een persoon zich in een noodsituatie bevindt als gevolg van ernstige hypoglykemie (zeer lage bloedsuikerspiegel), niet in staat is om te eten of te drinken en hulp van iemand anders nodig heeft.
- Het is belangrijk dat de mensen om je heen weten hoe ze de mogelijke tekenen van hypoglykemie kunnen herkennen, zodat ze voorbereid zijn en je op hun hulp kunt rekenen.
- Mogelijke tekenen van een hypoglykemie zijn onder andere:
  - Duizeligheid
  - Stemningswisselingen
  - Onoplettendheid of verwardheid
  - Gebrek aan coördinatie
  - Stuiptrekking of bewustzijnsverlies
  - Trillen of zweten



Houd de koker verzegeld tot op het moment van gebruik.

# HOE BAQSIMI® GEBRUIKEN?

## LEES DE GEBRUIKERSHANDLEIDING VAN BAQSIMI® VOOR GEBRUIK.

- Leg uw familieleden en vrienden uit waar u Baqsimi® bewaart en leg hen uit hoe ze het moeten gebruiken. **Zij dienen te weten hoe dit middel moet worden gebruikt vóór u het nodig heeft.**
- Verwijder de plastic folie niet en open de koker niet vooraleer u klaar bent om het te gebruiken. Als de koker open is geweest, kan vocht in de container terechtkomen en is het mogelijk dat het geneesmiddel niet meer naar behoren werkt.
- Druk de zuiger niet in totdat u klaar bent om de dosis toe te dienen. Anders gaat de enkele dosis in de verpakking verloren.
- Elke Baqsimi® verpakking voor éénmalig gebruik kan slechts één keer worden gebruikt.
- Baqsimi® mag niet worden gebruikt na de vervaldatum.

## VOORBEREIDING VAN DE DOSIS:

- Verwijder de folie door aan de rode strip te trekken.
- Open het deksel en haal de verpakking uit de koker.



Houd de koker verzegeld tot op het moment van gebruik.

# TOEDIENING BAQSIMI®

## TOEDIENING VAN DE DOSIS:



- **HOU** de verpakking voor éénmalig gebruik vast zoals op het plaatje.

**Druk de zuiger niet in vóór het aanbrengen in het neusgat.**



- **BRENG** de tip **IN** één van de neusgaten.



- **DRUK** de zuiger helemaal in tot de **groene lijn niet meer zichtbaar is.**

Lees aandachtig de de bijsluiter, inclusief de gebruikershandleiding voor meer gedetailleerde informatie over de toediening en handeling van Baqsimi® voordat u het geneesmiddel Baqsimi® gebruikt.

# TOEDIENING BAQSIMI®

(VERVOLG)

## NA HET GEVEN VAN DE DOSIS:

- Als de persoon bewusteloos is:
  - Draai de persoon op zijn/haar zij na het geven van Baqsimi®
  - **Bel onmiddellijk voor medische hulp.**
- Van zodra de persoon weer bij bewustzijn is en in staat is om te slikken, moedig de persoon aan om zo snel mogelijk iets heel zoet te eten of te drinken, zoals suiker of fruitsap.
- Gooi de gebruikte verpakking en de koker weg.



Houd de koker verzegeld tot op het moment van gebruik.

---

Wenst u een een video te consulteren  
die het juiste gebruik van Baqsimi® toelicht:  
**[www.BAQSIMI.eu](http://www.BAQSIMI.eu)**

---