



baqsimi®

(Glucagon) 3 mg poudre nasale en récipient unidose



Conservez le tube scellé
jusqu'à l'emploi.

Baqsimi® est une marque détenue ou autorisée par Amphastar, ses filiales ou sociétés affiliées.

E.R. : Amphastar France Pharmaceuticals
Usine Saint Charles 60590 Eragny sur Epte,
France
01-512-01-BE - Juin 2024



AMPHASTAR
PHARMACEUTICALS

© 2024 Amphastar



Pour tirer un bénéfice maximal des effets du médicament Baqsimi® sur votre santé, en assurer son bon usage et en limiter ses effets indésirables il existe certaines mesures / précautions à prendre qui sont expliquées dans ce matériel (RMA version 06/2024)



baqsimi®

(Glucagon) 3 mg poudre nasale en récipient unidose



NOTICE D'ADMINISTRATION POUR PATIENTS

Lisez attentivement la notice avant d'utiliser le médicament Baqsimi® (glucagon) 3 mg poudre nasale en récipient unidose. Le texte complet et actualisé de cette notice est disponible sur le site www.afmps.be, rubrique « Chercher des informations sur un médicament autorisé »

QU'EST-CE BAQSIMI® ?

- INDICATION

Baqsimi® est indiqué dans le traitement de l'hypoglycémie sévère chez les adultes, les adolescents et les enfants âgés de 4 ans et plus ayant un diabète.

- Baqsimi® est une forme de glucagon administré par pulvérisation nasale. Le glucagon est une hormone naturelle produite par le pancréas. Il a une action contraire à celle de l'insuline en augmentant le taux de sucre dans le sang.
- Baqsimi® est prêt à l'emploi. Il contient une dose précise et fixe. Il ne nécessite pas d'être reconstitué ni ajusté.
- Baqsimi® ne nécessite pas d'être inhalé. **Il doit être administré en cas de situation d'urgence due à une hypoglycémie sévère (taux très bas de sucre dans le sang), même si vous êtes inconscient, que votre nez est bouché ou que vous avez pris des décongestionnants.**
- Il n'est pas nécessaire de conserver Baqsimi® au réfrigérateur. Il doit être conservé à une température ne dépassant pas 30°C.



QUAND UTILISER BAQSIMI® ?

- Baqsimi® est utilisé lorsqu'une personne se trouve dans une situation d'urgence due à une hypoglycémie sévère (taux très bas de sucre dans le sang), où elle est incapable de manger ou de boire et où elle a besoin de l'aide de quelqu'un d'autre.
- Il est important que les personnes autour de vous sachent reconnaître les signes possibles d'une hypoglycémie, afin qu'elles soient préparées et que vous puissiez compter sur leur aide.
- Les possibles signes d'une urgence d'hypoglycémie comprennent :
 - Sensations vertigineuses
 - Fluctuations d'humeur
 - Inattention ou confusion
 - Manque de coordination
 - Convulsion ou perte de connaissance
 - Tremblements ou sueurs



Conservez le tube scellé
jusqu'à l'emploi.

COMMENT UTILISER BAQSIMI® ?

LIRE LE MANUEL D'UTILISATION DE BAQSIMI® AVANT DE L'UTILISER.

- Indiquez à votre famille et à vos amis l'endroit où vous conservez Baqsimi® et expliquez-leur comment l'utiliser. **Ils doivent savoir comment l'utiliser avant que vous en ayez besoin.**
- Ne retirez pas le film plastique et n'ouvrez pas le tube avant d'être prêt à l'utilisation. Si le tube a été ouvert, le médicament peut avoir été exposé à l'humidité et pourrait ne pas fonctionner comme prévu.
- N'appuyez pas sur le piston avant d'être prêt à administrer la dose. Sinon, la dose unique du récipient sera perdue.
- Chaque récipient unidose Baqsimi® ne peut être utilisé qu'une seule fois.
- Baqsimi® ne doit pas être utilisé après la date de péremption.

PRÉPARATION DE LA DOSE :

- Retirez le film plastique en tirant sur la bandelette rouge.
- Ouvrez le couvercle et retirez le récipient du tube.



Conservez le tube scellé jusqu'à l'emploi.


ADMINISTRATION BAQSIMI®

ADMINISTRATION DE LA DOSE :



- **TENEZ** le récipient unidose comme montré sur l'image.

N'appuyez pas sur le piston avant l'insertion dans la narine.



- **INSEREZ** l'embout dans l'une des narines.



- **APPUYEZ** sur le piston entièrement **jusqu'à ce que la ligne verte ne soit plus visible.**

Lisez attentivement la notice incluant le manuel d'utilisation pour des informations plus détaillées sur l'administration et la manipulation de Baqsimi® avant d'utiliser le médicament Baqsimi®.

ADMINISTRATION BAQSIMI®

(SUITE)

APRÈS ADMINISTRATION DE LA DOSE :

- Si la personne est inconsciente :
 - Tournez-la sur le côté après avoir administré Baqsimi®.
 - **Contactez immédiatement une assistance médicale.**
- Dès que la personne a repris connaissance et est à nouveau capable d'avaler, encouragez-la à prendre une collation très sucrée, comme du sucre, du jus de fruit le plus vite possible
- Jetez le récipient et le tube usagés



Conservez le tube scellé jusqu'à l'emploi.

Pour regarder une vidéo expliquant
comment utiliser Baqsimî®,
veuillez consulter le site internet :
www.BAQSIMI.eu
