



baqsimi®

(Glucagon) 3 mg Nasenpulver



Bewahren Sie das
Einzeldosisbehältnis
bis zur Anwendung im
eingeschweißten Röhrchen

Baqsimi® ist eine Marke, die im Besitz oder von Amphastar Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen.

V.U. : Amphastar France Pharmaceuticals
Usine Saint Charles 60590 Eragny sur Epte,
Frankreich
01-512-01-BE - Juni 2024



Um den Nutzen für Ihre Gesundheit dank der Wirkungen des Arzneimittels Baqsimi® (glucagon 3 mg Nasenpulver in einem Einzeldosisbehältnis) zu maximalisieren, um seine ordnungsgemäße Verwendung sicherzustellen und unerwünschten Wirkungen zu begrenzen, müssen bestimmte Maßnahmen/Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, die in dieser Dokumentation erklärt werden. (RMA Version 06/2024)



baqsimi®

(Glucagon) 3 mg Nasenpulver in einem Einzeldosisbehältnis)



ANWENDUNGSHINWEIS FÜR DEN PATIENTEN

Lesen Sie die Packungsbeilage sorgfältig, bevor Sie das Arzneimittel Baqsimi® (Glucagon) 3mg Nasenpulver in einem Einzeldosisbehältnis verwenden. Der vollständige und aktualisierte Text dieser Packungsbeilage ist auf der Webseite www.fagg.be, Abschnitt "Zoek informatie over een vergund geneesmiddel/ Chercher des informations sur un médicament autorisé" abrufbar.

WAS IST BAQSIMI®?

- ANWENDUNGSGEBIETE

Baqsimi® ist angezeigt zur Behandlung von schwerer Hypoglykämie bei Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern ab 4 Jahren mit Diabetes mellitus.

- Baqsimi® enthält den Wirkstoff Glucagon und wird angewendet mit einem Nasenpulver. Der Glucagon ist ein natürliches Hormon, das von der Bauchspeicheldrüse gebildet wird. Es zeigt die gegenteilige Wirkung von Insulin und erhöht den Blutzucker.
- Baqsimi® ist einsatzbereit. Es enthält nur eine Dosis Glucagon. Es besteht keine Notwendigkeit, das Arzneimittel zu rekonstituieren oder an zu passen.
- Es ist nicht notwendig, nach der Dosisabgabe zu inhalieren. **Es sollte im Notfall aufgrund einer schweren Hypoglykämie verabreicht werden (sehr niedriger Blutzuckerspiegel), auch wenn Sie bewusstlos sind, eine verstopfte Nase haben mit oder ohne gleichzeitige Anwendung eines abschwellenden Mittels.**
- Muss nicht im Kühlschrank aufbewahrt werden. Nicht über 30°C lagern



WANN BAQSIMI® ZU VERWENDEN?

- Baqsimi® wird verwendet wenn eine Person in einem Notfall ist als Folge von schweren Hypoglykämie (sehr niedriger Blutzucker), nicht in der Lage ist zu essen oder zu trinken und Hilfe braucht von Jemand anderem.
- Es ist wichtig, dass die Menschen um Sie herum wissen, wie sie mögliche Anzeichen einer Hypoglykämie erkennen können damit sie vorbereitet sind und Sie auf ihre Hilfe zählen können.
- Mögliche Anzeichen einer Hypoglykämie sind Unter anderem:
 - Schwindel
 - Stimmungsschwankungen
 - Unaufmerksam oder verwirrt sein
 - Mangelnde Koordinierung
 - Krämpfe oder Bewusstseinsverlust
 - Schütteln oder Schwitzen



Bewahren Sie das Einzeldosisbehältnis bis zur Anwendung im eingeschweißten Röhrchen

WIE VERWENDEN SIE BAQSIMI®?

LESEN SIE DIE GESAMTE PACKUNGSBEILAGE SORGFÄLTIG DURCH

- Zeigen Sie Ihrer Familie und Ihren Freunden, wo Sie Baqsimi® aufbewahren und erklären Sie ihnen anhand dieser Anweisungen, wie es anzuwenden ist. **Diese müssen wissen, wie es anzuwenden ist, bevor Sie es benötigen.**
- Entfernen Sie nicht die Plastikfolie und öffnen Sie das Röhrchen nicht, bis Sie bereit sind es zu verwenden. Wenn das Röhrchen geöffnet wurde, kann Feuchtigkeit in den Behälter und es ist möglich, dass der Medizin nicht mehr richtig wirkt.
- Baqsimi® enthält nur eine Dosis Glucagon. Drücken Sie den Kolben erst, wenn Sie bereit sind die dosis zu verabreichen in die Nase. Sonst geht die Einzeldosis in der Verpackung verloren.
- Baqsimi® ist nur zur Anwendung in der Nase und nur zum einmaligen Gebrauch vorgesehen.
- Baqsimi® darf nach dem Ablaufdatum nicht mehr verwendet werden.

VORBEREITUNG DER DOSIS:


- Entfernen Sie die geschweißte Folie durch Ziehen am roten Streifen.
- Öffnen Sie den Deckel und nehmen Sie das Einzeldosisbehältnis aus dem Röhrchen.



Bewahren Sie das Einzeldosisbehältnis bis zur Anwendung im eingeschweißten Röhrchen

BEDIENUNGSANLEITUNG BAQSIMI®

VERABREICHEN DER DOSIS:



- Halten Sie das Einzeldosisbehältnis zwischen den Fingern.

Drücken Sie den Kolben nicht vor dem Einfügen in die Nasenloch.



- Schieben Sie die Spitze behutsam in ein Nasenloch.



- Drücken Sie den Kolben vollständig durch bis wenn der grüne Streifen am Kolben nicht mehr sichtbar ist.

Lesen Sie die Packungsbeilage und der Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen.

BEDIENUNGSANLEITUNG BAQSIMI®

(WEITER)

NACH VERABREICHEN DER DOSIS:

- Wenn die Person mit niedrigem Blutzucker bewusstlos ist:
 - drehen Sie diese nach dem Verabreichen von Baqsimi® auf die Seite.
 - **Fordern Sie umgehend medizinische Hilfe an.**
- Halten Sie die betroffene Person dazu an, so schnell wie möglich einen Imbiss oder ein Getränk mit hohem Zuckergehalt zu sich zu nehmen, wie z. B. Zucker oder einen Fruchtsaft.
- Entsorgen Sie das verwendete Einzeldosisbehältnis und das Röhrchen.



Bewahren Sie das Einzeldosisbehältnis bis zur Anwendung im eingeschweißten Röhrchen

Hier kommen Sie zum
Baqsimi®-Schulungsvideo:
www.BAQSIMI.eu
