




# baqsimi

(glukagon) proszek do nosa 3 mg



## ULOTKA DOTYCZĄCA SPOSOBU PODAWANIA LEKU BAQSIMI

Osoby stosujące insulinę muszą być przygotowane na nagłe zmniejszenie poziomu cukru we krwi (ciężką hipoglikemię).

**Ulotka zawiera informacje, jak postępować w przypadku nagłego zmniejszenia stężenia cukru we krwi (tj. ciężkiej hipoglikemii).**

Przed zastosowaniem leku przeczytaj instrukcję użycia oraz ulotkę dołączoną do opakowania leku.

**Ważna informacja o bezpieczeństwie leku  
zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Rejestracji  
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych  
i Produktów Biobójczych**

## CO TO JEST LEK BAQSIMI?

- Lek Baqsimi zawiera glukagon w postaci proszku podawanego do nosa. Stosowany jest w przypadku ciężkiej hipoglikemii (bardzo niskiego stężenia cukru we krwi) u osób z cukrzycą. Lek jest przeznaczony dla dorosłych, młodzieży oraz dzieci w wieku od 4 lat.
- Glukagon jest naturalnym hormonem wytwarzanym w trzustce. Działa przeciwnie do insuliny i powoduje zwiększenie stężenia cukru we krwi.
- Lek Baqsimi jest gotowy do użycia i nie wymaga mieszania ani odmierzania. Jest dostępny w dokładnej i już odmierzonej dawce.
- Lek Baqsimi nie musi być wdychany, ponieważ jest wchłaniany przez błonę śluzową nosa. **Lek należy podać w przypadku gwałtownego zmniejszenia stężenia cukru we krwi, nawet jeśli osoba jest nieprzytomna, ma zatłakany nos lub przyjęła leki obkurczające śluzówkę nosa.**
- Lek Baqsimi nie musi być przechowywany w lodówce. Należy go przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.



Przed zastosowaniem leku przeczytaj instrukcję użycia oraz ulotkę dołączoną do opakowania leku.

# KIEDY STOSOWAĆ LEK BAQSIMI?

- Lek Baqsimi stosuje się doraźnie w przypadku gwałtownego zmniejszenia stężenia cukru we krwi, gdy osoba nie może jeść ani pić i potrzebuje pomocy innych.
- Ważne jest, aby osoby z otoczenia umiały rozpoznać możliwe objawy gwałtownego zmniejszenia stężenia cukru we krwi i były przygotowane na udzielenie pomocy, a także aby można było liczyć na ich pomoc.

Możliwe oznaki gwałtownego zmniejszenia stężenia cukru we krwi:

- Zawroty głowy
- Brak koncentracji uwagi lub dezorientacja
- Wahania nastroju
- Brak koordynacji
- Drgawki lub utrata przytomności
- Drżenie albo nadmierna potliwość



Tuba powinna być  
szczelnie zamknięta  
do czasu użycia.



**baqsimi**

(glukagon) proszek do nosa 3 mg

# JAK STOSOWAĆ LEK BAQSIMI?

**Przed zastosowaniem leku Baqsimi przeczytaj instrukcję użycia.**

- Pokaż rodzinie i przyjaciołom miejsce przechowywania leku Baqsimi i wyjaśnij im, jak należy go używać. **Osoby te muszą wiedzieć, jak użyć leku, zanim będzie on potrzebny.**
- **Nie usuwaj** folii termokurczliwej i nie otwieraj tuby do czasu użycia leku. Jeśli tuba zostanie otwarta wcześniej, do środka może przedostać się wilgoć i lek może działać nieprawidłowo.
- **Nie wciskaj** tłoka do czasu podania dawki. W przeciwnym razie możesz stracić pojedynczą dawkę w pojemniku. Nie należy stosować leku Baqsimi po upływie terminu ważności.

## Przygotowanie dawki:

- Zdejmij folię termokurczliwą, pociągając czerwony pasek.
- Otwórz wieczko i wyjmij pojemnik z tuby.



Tuba powinna być szczelnie zamknięta do czasu użycia.


Przed zastosowaniem leku przeczytaj instrukcję użycia oraz ulotkę dołączoną do opakowania leku.

# SPOSÓB PODAWANIA LEKU BAQSIMI

Podanie dawki:



- **PRZYTRZYMAJ** pojemnik jednodawkowy w sposób pokazany na rysunku. **Nie wciskaj tłoka przed umieszczeniem końcówki w nozdrzu.**



- **UMIEŚĆ** końcówkę dozownika w jednym nozdrzu.



- **WCIŚNIJ** tłok do oporu tak, by **zielona linia stała się niewidoczna.**



**baqsimi**

(glukagon) proszek do nosa 3 mg

# SPOSÓB PODAWANIA LEKU BAQSIMI (CIAĞ DALSZY)

## Po podaniu dawki:


Jeśli osoba jest nieprzytomna, po podaniu leku Baqsimi ułóż ją na boku.

## Niezwłocznie wezwij pomoc medyczną.

Zachęć osobę, aby jak najszybciej zjadła przekąskę lub wypła napój o dużej zawartości cukru (np. słodczy lub sok owocowy).

## Wyrzucić zużyty pojemnik i tubę.

Tuba powinna być szczelnie zamknięta do czasu użycia.



---

Na stronie **[www.baqsimi.eu](http://www.baqsimi.eu)** można obejrzeć film prezentujący właściwy **sposób podawania leku Baqsimi.**


---

Przed zastosowaniem leku przeczytaj instrukcję użycia oraz ulotkę dołączoną do opakowania leku.

# POINFORMUJ INNYCH, ŻE MASZ PRZY SOBIE LEK BAQSIMI

Zawieszka i karta leku BAQSIMI informują osoby z otoczenia, gdzie szukać leku, aby pomóc Ci w przypadku gwałtownego zmniejszenia stężenia cukru we krwi.

Wybierz najlepsze dla siebie rozwiązanie i trzymaj zawieszkę lub kartę tam, gdzie inni będą mogli ją łatwo znaleźć. Upewnij się, że w pozostawionym pustym polu jest wpisane miejsce przechowywania leku Baqsimi.



**baqsimi**  
(glukagon) proszek do nosa 3 mg

# W RAZIE JAKICHKOLWIEK DALSZYCH WĄTPLIWOŚCI LUB PYTAŃ ZWIĄZANYCH ZE STOSOWANIEM TEGO LEKU, NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO LEKARZA, FARMACEUTY LUB PIELĘGNIARKI

## Zgłaszanie działań niepożądanych

Uprzejmie przypominamy o konieczności zgłaszania wszelkich działań niepożądanych potencjalnie związanych ze stosowaniem leku za pośrednictwem:

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309

Strona internetowa: <https://smz.ezdrowie.gov.pl>

a także bezpośrednio do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Amphastar France Pharmaceuticals,

Usine Saint Charles,

Eragny Sur Epte,

60590

Francja

tel.: +48 22 185 75 64

e-mail: [gps@amphastar.com](mailto:gps@amphastar.com)

01-512-01-PL



**AMPHASTAR**  
PHARMACEUTICALS

### Kontakt z firmą Amphastar:

Amphastar France Pharmaceuticals,

Usine Saint Charles,

Eragny Sur Epte,

60590

Francja

tel.: +48 22 185 75 64

e-mail: [gps@amphastar.com](mailto:gps@amphastar.com)

© 2024 Amphastar