



Förvaras i den plastförseglade innerförpackningen tills läkemedlet ska användas.

Amphastar France Pharmaceuticals
Usine Saint Charles 60590 Eragny sur Epte,
Frankrike

© 2024 Amphastar
Baqsimi® is a registered trademark of Amphastar

TILL DIG SOM HAR FÅTT FÖRSKRIVET

BAQSIMI®

(glukagon 3 mg näspulver i endosbehållare)



VAR FÖRBEREDD VID SVÅR HYPOGLYKEMI

INDIKATION

BAQSIMI är avsett för behandling av svår hypoglykemi hos vuxna, ungdomar och barn från 4 års ålder med diabetes mellitus.

Läs alltid bipacksedel och bruksanvisning noga innan användning. Vid frågor kontakta din läkare.

VAD ÄR BAQSIMI?

- BAQSIMI används för att behandla svår hypoglykemi (mycket lågt blodsocker) hos personer med diabetes.
- BAQSIMI innehåller glukagon, ett naturligt hormon som höjer blodsockret (i motsats till insulin som sänker blodsockret).
- BAQSIMI är färdigt att använda och ges direkt i näsan med en endosbehållare.
- BAQSIMI tas upp i nässlemhinnan. Upptaget påverkas inte av nästäppa eller avsvällande nässpray.
- BAQSIMI ska förvaras i den plastförseglade innerförpackningen tills läkemedlet ska användas. Förvaras i rumstemperatur (max 30 °C).



NÄR ANVÄNDS BAQSIMI?

- BAQSIMI används vid svår hypoglykemi då personen inte klarar av att äta eller dricka och behöver hjälp med att höja blodsockret.
- Det är viktigt att personer i din omgivning har kunskap om och känner till symtom som kan uppstå vid lågt blodsocker.

Exempel på symtom vid svår hypoglykemi:

- Yrsel
- Humörsvängningar
- Förvirring
- Försämrad koordination
- Kramper eller medvetlöshet
- Darrig, skakig, svettningar



Obs! Förvaras i den plastförseglade innerförpackningen tills läkemedlet ska användas.

ATT ANVÄNDA BAQSIMI

1. Läs bruksanvisningen i förpackningen innan användning:

- Visa din familj, dina vänner och arbetskamrater var du förvarar BAQSIMI och förklara när och hur det ska användas. **De behöver veta hur de ska göra, innan du behöver behandlingen.**
- **Förvara BAQSIMI i den inre förpackningen med plastförseglingen på** tills läkemedlet ska användas. Om den inre förpackningen öppnas kan fukt komma in vilket kan påverka läkemedlets effekt.
- BAQSIMI innehåller endast en dos glukagon, så **tryck inte in kolven innan du placerat endosbehållarens spets i näsan.** Om du gör det är engångsdosen i behållaren förbrukad.
- Använd inte BAQSIMI om utgångsdatum har passerat.

2. Förebered dosen:

- Ta bort plastförseglingen genom att dra i den röda remsan.
- Öppna locket och ta upp endosbehållaren ur den inre förpackningen.




Förvaras i den plastförseglade innerförpackningen tills läkemedlet ska användas.

3. Ge dosen:



- **Håll** endosbehållaren mellan fingrarna. **Tryck inte in kolven eller testa endosbehållaren.**



- **För in spetsen** i ena näsborren tills fingrarna rör vid utsidan av näsan.



- **Tryck in kolven** helt med tummen, **tills den gröna linjen på kolven inte syns längre.**

4. Efter given dos:

Om personen med lågt blodsocker är medvetslös ska personen vändas på sidan.

Ring alltid och omedelbart 112 för medicinsk hjälp.

Om personen är vid medvetande, försök få personen att så snart som möjligt äta eller dricka något med högt sockernehåll, t.ex. druvsocker, sötsaker eller fruktjuice.

Släng den använda endosbehållaren samt innerförpackningen.

OBS! Förvaras i den plastförseglade innerförpackningen tills läkemedlet ska användas.



På baqsimi.eu kan du se en instruktionsfilm om hur du använder Baqsimi.

Baqsimi (glukagon), näspulver i endosbehållare, 3 mg

Indikationer: Baqsimi är avsett för behandling av svår hypoglykemi hos vuxna, ungdomar och barn från 4 års ålder med diabetes mellitus.

Kontraindikationer: Feokromocytom

Varningar och försiktighet: Om du har en tumör i bukspottkörteln, så kallat insulinom.

Om du inte har tillräckligt med glykogen i levern. Detta kan inträffa vid svälttillstånd, om binjurarna inte producerar tillräckligt med kortisol eller aldosteron eller om du har kronisk hypoglykemi.

Om du är osäker på om något av ovanstående gäller dig, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Baqsimi.

Läs noga igenom bipacksedeln innan du börjar använda detta läkemedel.

För ytterligare information se www.fass.se


Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning: Amphastar France Pharmaceuticals, Usine Saint Charles 60590 Eragny sur Epte, Frankrike. +46 10 102 04 47, amphastar.com.

HJÄLP ANDRA FÖRSTÅ ATT DU HAR BAQSIMI MED DIG

BAQSIMI informationsbricka och -kort informerar personer i omgivningen hur de kan hjälpa dig om du drabbas av en svår hypoglykemi.

Förvara brickan/kortet så att andra lätt kan hitta det t.ex. i plånboken, handväskan eller i mobilfodralet.

Glöm inte att fylla i den vita rutan var du förvarar BAQSIMI.

 **JAG HAR DIABETES
VID EN AKUT SITUATION
RING 112 OCH LETA
EFTER EN GUL
PLASTFÖRPACKNING**

**JAG HAR DIABETES
OM MITT
BLODSOCKER
BLIR FÖR LÅGT
BEHÖVER JAG
HJÄLP**

Leta efter en gul plastförpackning i:




**Förpackningen ska endast öppnas
vid användning.**

**Följ anvisning på förpackningen
och ring 112.**

**JAG HAR DIABETES
VID EN AKUT SITUATION
RING 112 OCH LETA
EFTER EN GUL
PLASTFÖRPACKNING**

**JAG HAR DIABETES
OM MITT
BLODSOCKER
BLIR FÖR LÅGT
BEHÖVER JAG
HJÄLP**

Leta efter en gul plastförpackning i:



**Förpackningen ska endast
öppnas vid användning.
Följ anvisning på förpackningen
och ring 112.**

**I HAVE DIABETES
IN CASE OF EMERGENCY
CALL 112 AND LOOK FOR
A YELLOW TUBE**

01-512-01-SE 02/2024 © 2024 Amphastar
All rights reserved.

**I HAVE DIABETES IN
A LOW BLOOD
SUGAR EMERGENCY,
I'M UNABLE
TO HELP MYSELF**

Look for a small yellow tube in/on

**Keep tube sealed until
ready to use.**

**Follow the instructions for use
and call 112 for medical help.**

01-512-01-SE 02/2024
© 2024 Amphastar
All rights reserved.