

Izobraževalno gradivo je pripravljeno z namenom zagotavljanja varne in učinkovite uporabe zdravila ter ustreznega obvladovanja določenih pomembnih tveganj in je odobreno s strani JAZMP (08/2024).

# VODNIK ZA BOLNIKE

---

**Navodila za ravnanje  
v primeru hudega padca  
vrednosti sladkorja v krvi  
(hude hipoglikemije)**



Zdravilo Baqsimi (glukagon) je indicirano za zdravljenje hude hipoglikemije pri odraslih, mladostnikih in otrocih, starih 4 leta in več, s sladkorno boleznijo.

Pred uporabo zdravila natančno preberite Navodilo za uporabo.

# KAJ JE ZDRAVILO BAQSIMI

- Zdravilo Baqsimi je glukagon v obliki za nazalno uporabo. Glukagon je naravni hormon, ki ga proizvaja žleza slinavka. Deluje nasprotno kot insulin in zvišuje vrednost sladkorja v krvi.
- Zdravilo je pripravljeno za uporabo in ga ni treba mešati ali odmerjati. Na voljo je v natančnem in vnaprej odmerjenem odmerku.
- Zdravilo ni namenjeno vdihavanju. **Uporabiti ga je treba ob hudem padcu vrednosti sladkorja v krvi, tudi če ste nezavestni, imate zamašen nos ali ste vzeli dekongestiv (zdravilo za odmašitev nosu).**
- Zdravila ni treba shranjevati v hladilniku. Shranjujte ga pri temperaturi do 30 °C.



# KDAJ UPORABITI ZDRAVILO

- Zdravilo se uporablja, kadar nekdo doživi hud padec vrednosti sladkorja v krvi in ne more jesti ali piti ter potrebuje pomoč druge osebe.
- Pomembno je, da ljudje okrog vas prepoznajo morebitne znake hudega padca vrednosti sladkorja v krvi, tako da so lahko pripravljeni in se nanje lahko zanesete, da vam bodo pomagali.

Morebitni znaki hudega padca vrednosti sladkorja v krvi vključujejo:

- omotico
- nepozornost ali zmedenost
- epileptični napad ali izgubo zavesti
- nihanja razpoloženja
- pomanjkanje koordinacije
- tresenje ali znojenje

# KAKO UPORABLJATI ZDRAVILO

Pred uporabo zdravila natančno preberite navodila za uporabo.

- Družinskim članom in prijateljem pokažite, kje hranite zdravilo in jim pojasnite, kako zdravilo uporabljati. **Vedeti morajo, kako ga uporabljati, preden ga boste potrebovali.**
- **Ne** odstranjujte ovojne folije in ne odpirajte tulca, dokler niste pripravljeni na uporabo. Če je tulec odprt, lahko v zdravilo vdre vlaga, zato morda ne bo delovalo po pričakovanjih.
- **Ne** pritiskajte bata, dokler niste pripravljeni na dajanje odmerka, sicer boste izgubili enkratni odmerek v odmerniku.
- Zdravila ne smete uporabljati po izteku roka uporabnosti.

## Priprava odmerka:

- Povlecite rdeči trak in odstranite ovijalno folijo.
- Odprite pokrovček in vzemite odmernik iz tulca.

# DAJANJE ZDRAVILA

Dajanje odmerka:



- **DRŽITE** vsebnik, kot je prikazano. **Bata ne pritisnite pred vstavitvijo.**



- Konico **VSTAVITE** v eno izmed nosnic.



- Bat **PRITISNITE** do konca, dokler zelena črta ni več vidna.

## PO ODMERKU

- Če je oseba nezavestna, jo po aplikaciji zdravila Baqsimi obrnite na bok.
- **Takoj pokličite zdravniško pomoč.**
- Osebo spodbujajte, da naj čim prej zaužije hrano ali pijačo z visoko vsebnostjo sladkorja, kot so slaščice ali sadni sok.
- Uporabljeni odmernik in tulec zavržite.

**Do poučnega videoposnetka za usposabljanje lahko dostopate prek spletne povezave: [www.baqsimi.eu](http://www.baqsimi.eu)**

### POROČANJE O NEŽELENIH UČINKIH

Pred uporabo zdravila natančno preberite Navodilo za uporabo.

Če opazite katerikoli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom, farmacevtom ali drugim zdravstvenim delavcem.

O domnevnem neželenem učinku lahko poročate tudi neposredno Nacionalnemu centru za farmakovigilanco prek spletnega obrazca ali na drug način naveden na spletni strani JAZMP ([www.jazmp.si/humana-zdravila/farmakovigilanca/porocanje-o-nezelenih-ucinkih-zdravil/](http://www.jazmp.si/humana-zdravila/farmakovigilanca/porocanje-o-nezelenih-ucinkih-zdravil/)).

# OPOZORILNA KARTICA ZA BOLNIKA

Opozorilna kartica za bolnika s sladkorno boleznijo je namenjena obveščanju bližnjih kako ukrepati, da vam pomagajo pri zdravljenju hudega padca vrednosti sladkorja v krvi.

Obvestite bližnje, da imate pri sebi zdravilo Baqsimi in kje ga hranite.

Mesto  
za opozorilno kartico

Amphastar France Pharmaceuticals  
Usine Saint Charles 60590 Eragny sur Epte  
Francija  
080 083172 / [gps@amphastar.com](mailto:gps@amphastar.com)

01-512-01-SI 26.2.2024





# Opozorilna kartica za bolnika

**IMAM SLADKORNO  
BOLEZEN.**

**OB HUDEM PADCU VREDNOSTI  
SLADKORJA V KRVI POIŠČITE  
MAJHEN RUMEN TULEC.**

Imam nizke vrednosti sladkorja v krvi  
in si ne morem pomagati sam/-a.

Poiščite majhen rumen tulec v/na:



Tulec naj bo zaprt do uporabe.

**Upoštevajte navodila za uporabo  
in nato pokličite nujno zdravniško  
pomoč.**

Izobraževalno gradivo je odobreno  
s strani JAZMP (08/2024).

Pred uporabo zdravila natančno  
preberite navodilo za uporabo.

## Dajanje odmerka:



**DRŽITE**  
vsebnik, kot je  
prikazano. Bata  
ne pritisnite  
pred vstavitvijo.



Konico  
**VSTAVITE** v eno  
izmed nosnic.



Bat **PRITISNITE**  
do konca,  
dokler zelena  
črta ni več  
vidna.